

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA PSA (Peste Suina Africana) CHE RIGUARDANO I CACCIATORI LOMBARDI

Le zone di restrizione si dividono in 3 tipologie e vengono indicate con i numeri romani:

- Zona di restrizione di Tipo III: riscontrati casi di infezione tra suini domestici
- Zona di restrizione di Tipo II: riscontrati casi di infezione tra cinghiali selvatici
- Zona di restrizione di Tipo I: zone confinanti con Zona tipo II o III

La lista dei comuni Lodigiani coinvolti non viene qui riportata perché in continua evoluzione comunque al momento sono solo di Tipo I, ci si può comunque informare tramite gli ATC di competenza e le Associazioni Venatorie di appartenenza.

**ATTENZIONE!!! LE LIMITAZIONI DELLE ATTIVITA' ALL' APERTO IVI COMPRESA L' ATTIVITA' VENATORIA SI APPLICANO ESCLUSIVAMENTE NELLE ZONE TIPO II e III.**

### SOMMARIO DELLE LIMITAZIONI:

- È vietata la caccia collettiva in più di tre persone a qualunque specie cacciabile
- È vietata sempre la caccia al Cinghiale (Sus Scrofa)
- Sono consentite le altre tipologie di caccia anche vagante anche con l' utilizzo del cane
- Sono consentiti al massimo 3 cani per cacciatore o gruppo di cacciatori
- È consentita l'attività di allenamento/addestramento cani (MAX 3) tranne che per la specie Cinghiale
- Tutto ciò che è consentito va svolto seguendo il protocollo di Biosicurezza di cui allegato 4 ordinanza Regionale n° 2/2024

### CENNI ALLEGATO 4 ORDINANZA 2/2024:

- Sono fondamentali una serie di “buone pratiche” per prevenire la diffusione del Virus della PSA
- Queste pratiche sono riferite a coloro che provengono da Zone Infette Tipo II e III
- Disinfezione autoveicoli specie gli pneumatici
- Profilassi antiparassitaria contro le zecche
- Smaltimento rifiuti alimentari in contenitori idonei e non darli ad animali domestici
- Non lasciare rifiuti alimentari in aree accessibili ai cinghiali
- Avvisare le autorità competenti se si trova una carcassa di cinghiale
- Per i Conducenti Cinofili: pulire e disinfettare le attrezzature, i vestiti, i veicoli prima di lasciare la Zona infetta e ripetere le operazioni una volta raggiunto il proprio domicilio

### ELENCO DISINFETTANTI RICONOSCIUTI IDONEI NEI CONFRONTI DEL VIRUS PSA

- Carbonato di calcio 40%---strutture interne/esterne, oggetti e utensili
- Ortofenilfenolo 1%-----strutture interne e ambienti
- Lysol 5% e Ipoclorito di sodio 1%-----mezzi di trasporto, indumenti di lavoro e oggetti vari
- Soda caustica-----animali abbattuti, carcasse e deiezioni
- Virkon S 1%-----strutture interne e ambienti
- Clorexina per uso veterinario-----zampe dei cani, collari, guinzagli ,pettorine